



Levantamento das aves silvestres de Saquarema e os desafios para a conservação na Mata Atlântica costeira no Sudeste brasileiro

Thayane Patusco^{1*}

 <https://orcid.org/0000-0001-9657-6677>

* Contato principal

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, Rio de Janeiro/RJ, Brasil. <thayanepatusco@gmail.com>.

Recebido em 21/02/2024 – Aceito em 15/01/2025

Como citar:

Patusco T. Levantamento das aves silvestres de Saquarema e os desafios para a conservação na Mata Atlântica costeira no Sudeste brasileiro. Biodivers. Bras. [Internet]. 2025; 15(3): 98-115. doi: 10.37002/biodiversidadebrasileira.v15i3.2549

Material Suplementar

Tabela 2 – Lista de ordens, famílias, espécies, nomes científicos e populares das aves observadas no período de 2013 a 2022, no município de Saquarema, Rio de Janeiro. Também são indicadas as espécies migratórias (Mig.), o tipo de *habitat* onde foram avistadas (*Habitat*), as categorias de ameaça IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas de Extinção) e CMS (Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres).

Ordem/Família	Nome científico	Nome popular	Mig.	Habitat	Status		
					IUCN	CITES	CMS
ACCIPITRIFORMES							
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	águia-pescadora	x	áreas úmidas	LC	II	APII
Accipitridae	<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha	x	formações florestais, formações campestres	LC	II	-
	<i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)	gavião-do-banhado		áreas úmidas	LC	II	-
	<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro	x	áreas úmidas	LC	II	-
	<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	gavião-caracoleiro		formações florestais	LC	II	-
	<i>Geranospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	gavião-pernilongo		formações florestais, formações campestres	LC	II	-
	<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	gavião-caboclo		formações campestres	LC	II	-

Accipitridae	<i>Amadonastur lacernulatus</i> (Temminck, 1827)	gavião-pombo-pequeno		formações florestais	VU	-	-
	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó		áreas antrópicas, formações florestais, campos	LC	II	-
	<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura	x	formações florestais, formações campestres	LC	II	-
	<i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824)	gavião-asa-de-telha		formações florestais, formações campestres	LC	II	-
	<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-gato		formações florestais	LC	II	-
	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	gavião-peneira		formações campestres, áreas antrópicas	LC	II	-
	<i>Spizaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-pato		formações florestais	LC	II	-
	<i>Geranoaetus albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-de-rabo-branco		formações campestres	LC	II	-
	<i>Buteo brachyurus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-de-cauda-curta		formações florestais, formações campestres	LC	II	-
	<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco		formações florestais	LC	II	-
ANSERIFORMES							
Anatidae	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	marreca-cabocla		áreas úmidas, áreas úmidas	LC	III	-
	<i>Nomonyx dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	marreca-caucau		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	marreca-ananaí		áreas úmidas, áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Anas bahamensis</i> (Linnaeus, 1758)	marreca-toicinho		áreas úmidas, áreas úmidas	LC	-	-
APODIFORMES							
Apodidae	<i>Streptoprocne biscutata</i> (Sclater, 1866)	taperuçu-de-coleira-falha		formações campestres	LC	-	-
	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca		formações campestres	LC	-	-
	<i>Chaetura meridionalis</i> (Hellmayr, 1907)	andorinhão-do-temporal	x	formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
Trochilidae	<i>Phaethornis idaliae</i> (Bourcier & Mulsant, 1856)	rabo-branco-mirim		formações florestais	LC	II	-
	<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	rabo-branco-rubro		formações florestais	LC	II	-
	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura		formações florestais, áreas antrópicas	LC	II	-
	<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta	x	formações florestais, áreas antrópicas	LC	II	-
	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	x	formações florestais	LC	II	-
	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho		formações florestais, formações campestres	LC	II	-
	<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta		formações florestais	LC	II	-

Trochilidae	<i>Polytmus guainumbi</i> (Pallas, 1764)	beija-flor-de-bico-curvo		formações florestais	LC	II	-
	<i>Chionomesa fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde		formações florestais	LC	II	-
	<i>Ramphodon naevius</i> (Dumont, 1818)	beija-flor-rajado		formações florestais	LC	II	-
	<i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783)	estrelinha-ametista		formações florestais	LC	II	-
	<i>Chlorestes cyanus</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-roxo		formações florestais	LC	II	-
CAPRIMULGIFORMES							
Caprimulgidae	<i>Nyctidromus albigollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau		formações campestres	LC	-	-
	<i>Podager nacunda</i> (Vieillot, 1817)	corução	x	formações campestres	LC	-	-
	<i>Hydropsalis parvula</i> (Gould, 1837)	bacurau-chintã		formações campestres	LC	-	-
CARIAMIFORMES							
Cariamidae	<i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)	seriema		formações campestres	LC	-	-
CATHARTIFORMES							
Cathartidae	<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha		formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	Apêndice II
	<i>Cathartes burrovianus</i> (Cassin, 1845)	urubu-de-cabeça-amarela		formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	Apêndice II
	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	Apêndice II
CHARADRIIFORMES							
Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		áreas úmidas (lagunar, lacustre, praia), formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
	<i>Pluvialis dominica</i> (Statius Muller, 1776)	batuiriçu	x	áreas úmidas (praia), formações campestres	LC	-	-
	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	batuiriçu-de-axila-preta	x	áreas úmidas (praia), formações campestres	LC	-	-
	<i>Charadrius semipalmatus</i> (Bonaparte, 1825)	batuíra-de-bando	x	áreas úmidas (praia), formações campestres	LC	-	-
	<i>Charadrius collaris</i> (Vieillot, 1818)	batuíra-de-coleira		áreas úmidas (praia), formações campestres	LC	-	-
Haematopodidae	<i>Haematopus palliatus</i> (Temminck, 1820)	piru-piru		áreas úmidas (praia)	LC	-	Apêndice II
Jacaniidae	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã		áreas úmidas, brejos	LC	-	-
Laridae	<i>Larus dominicanus</i> (Lichtenstein, 1823)	gaivotão		áreas úmidas (praia)	LC	-	-
	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> (Vieillot, 1818)	gaivota-de-cabeça-cinza	x	áreas úmidas (praia)	LC	-	-
	<i>Leucophaeus pipixcan</i> (Wagler, 1831)	gaivota-de-franklin	x	áreas úmidas (praia)	LC	-	-
	<i>Leucophaeus atricilla</i> (Linnaeus, 1758)	gaivota-alegre	x	áreas úmidas (praia)	LC	-	-

Laridae	<i>Anous stolidus</i> (Linnaeus, 1758)	trinta-réis-escuro		áreas úmidas (praia)	LC	-	-
	<i>Thalasseus maximus</i> (Boddaert, 1783)	trinta-réis-real	x	áreas úmidas (praia)	LC	-	-
	<i>Thalasseus acuflavidus</i> (Cabot, 1847)	trinta-réis-de-bando	x	áreas úmidas (praia)	LC	-	-
	<i>Sterna hirundo</i> (Linnaeus, 1758)	trinta-réis-boreal	x	áreas úmidas (praia)	LC	-	-
	<i>Rynchops niger</i> (Linnaeus, 1758)	talha-mar	x	áreas úmidas (praia)	LC	-	-
Recurvirostridae	<i>Himantopus melanurus</i> (Vieillot, 1817)	pernilongo-de-costas-brancas		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Himantopus mexicanus</i> (Statius Muller, 1776)	pernilongo-de-costas-negras		áreas úmidas	LC	-	-
Scolopacidae	<i>Numenius hudsonicus</i> (Latham, 1790)	maçarico-de-bico-torto	x	áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Limosa haemastica</i> (Linnaeus, 1758)	maçarico-de-bico-virado	x	áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-pintado	x	áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	vira-pedras	x	áreas úmidas (lagunar, lacustre, praia)	LC	-	-
	<i>Gallinago paraguaiae</i> (Vieillot, 1816)	narceja		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-de-colete	x	áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	maçarico-branco	x	áreas úmidas (lagunar, lacustre, praia)	LC	-	-
	<i>Calidris pusilla</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-rasteirinho	x	áreas úmidas (lagunar, lacustre, praia)	NT	-	Apêndice I
	<i>Calidris himantopus</i> (Bonaparte, 1826)	maçarico-pernilongo	x	áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-de-sobre-branco	x	áreas úmidas (lagunar, lacustre, praia)	LC	-	-
	<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-grande-de-perna-amarela	x	áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Tringa semipalmata</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-asa-branca	x	áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-perna-amarela	x	áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	maçarico-galego	x	áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Calidris minutilla</i> (Vieillot, 1819)	maçariquinho	x	áreas úmidas	LC	-	-
CICONIIFORMES							
Ciconiidae	<i>Ciconia maguari</i> (Gmelin, 1789)	maguari		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Jabiru mycteria</i> (Lichtenstein, 1819)	tuiuiú		áreas úmidas	LC	I	-

COLUMBIFORMES							
Columbidae	<i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766)	rolinha-de-asa-canela		formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa		formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
	<i>Columba livia</i> (Gmelin, 1789)	pombo-doméstico		áreas antrópicas	LC	-	-
	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	asa-branca		formações florestais, áreas antrópicas	LC	-	-
	<i>Leptotila verreauxi</i> (Bonaparte, 1855)	juriti-pupu		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri		formações florestais	LC	-	-
CORACIIFORMES							
Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande		áreas úmidas (lagunar, lacustre, praia)	LC	-	-
	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno		áreas úmidas	LC	-	-
CUCULIFORMES							
Cuculidae	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		formações florestais, formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
	<i>Coccyzus melacoryphus</i> (Vieillot, 1817)	papa-lagarta-acanelado	x	formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Crotophaga major</i> (Gmelin, 1788)	anu-coroca		formações campestres	LC	-	-
	<i>Crotophaga ani</i> (Linnaeus, 1758)	anu-preto		formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco		formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
	<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci		formações campestres	LC	-	-
FALCONIFORMES							
Falconidae	<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	carcará		formações campestres, áreas úmidas (praia)	LC	II	-
	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro		formações campestres	LC	II	-
	<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã		formações florestais, formações campestres	LC	II	-
	<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	falcão-relógio		formações florestais, formações campestres	LC	II	-
	<i>Falco peregrinus</i> (Tunstall, 1771)	falcão-peregrino	x	formações campestres, áreas úmidas (praia)	LC	I	Apêndice II
	<i>Falco sparverius</i> (Linnaeus, 1758)	quiri-quiri		formações campestres, áreas antrópicas	LC	II	Apêndice II
	<i>Falco femoralis</i> (Temminck, 1822)	falcão-de-coleira		formações campestres	LC	II	Apêndice II
GALBULIFORMES							
Galbulidae	<i>Galbula ruficauda</i> (Cuvier, 1816)	ariramba		formações florestais	LC	-	-

GALLIFORMES							
Cracidae	<i>Penelope superciliaris</i> (Temminck, 1815)	jacupemba		formações florestais	LC	-	-
GRUIFORMES							
Aramidae	<i>Aramus guaraúna</i> (Linnaeus, 1766)	carão		áreas úmidas, brejos	LC	-	-
Rallidae	<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Aramides cajaneus</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Rufirallus viridis</i> (Statius Muller, 1776)	sanã-castanha		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Rallus longirostris</i> (Boddaert, 1783)	saracura-matraca		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Mustelirallus albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Pardirallus sanguinolentus</i> (Swainson, 1838)	saracura-do-banhado	x	áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)	galinha-d'água		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d'água-azul	x	áreas úmidas	LC	-	-
NYCTIBIFORMES							
Nyctibiidae	<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	urutau		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
PASSERIFORMES							
Conopophagidae	<i>Conopophaga melanops</i> (Vieillot, 1818)	cuspidor-de-máscara-preta		formações florestais	LC	-	-
Corvidae	<i>Cyanocorax cristatellus</i> (Temminck, 1823)	gralha-do-campo		formações campestres	LC	-	-
Dendrocolaptidae	<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado		formações florestais	LC	-	-
	<i>Dendrocincla turdina</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-liso		formações florestais	LC	-	-
Donacobiidae	<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	japacanim		áreas úmidas	LC	-	-
Estrildidae	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre		formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
Furnariidae	<i>Furnarius figulus</i> (Lichtenstein, 1823)	casaca-de-couro-da-lama		formações campestres	LC	-	-
	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
	<i>Phacellodomus rufifrons</i> (Wied, 1821)	joão-de-pau		formações campestres, formações florestais	LC	-	-
	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié		áreas úmidas	LC	-	-

Fringillidae	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim		formações florestais	LC	-	-
	<i>Euphonia violácea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro		formações florestais	LC	-	-
	<i>Euphonia xanthogaster</i> (Sundevall, 1834)	fim-fim-grande		formações florestais	LC	-	-
Hirundinidae	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora	x	formações campestres	LC	-	-
	<i>Progne tapera</i> (Linnaeus, 1766)	andorinha-do-campo	x	formações campestres	LC	-	-
	<i>Progne subis</i> (Linnaeus, 1758)	andorinha-azul	x	formações campestres	LC	-	-
	<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-grande	x	formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
	<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco		formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
	<i>Hirundo rustica</i> (Linnaeus, 1758)	andorinha-de-bando	x	formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
Icteridae	<i>Agelasticus atroolivaceus</i> (Wied-Neuwied, 1831)	carretão		formações campestres, áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe		áreas úmidas, formações florestais	LC	-	-
	<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldi		áreas úmidas, formações florestais	LC	-	-
	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	pássaro-preto		áreas antrópicas, formações campestres	LC	-	-
	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chupim		áreas antrópicas, formações campestres	LC	-	-
	<i>Leistes supercilialis</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul		formações campestres, áreas úmidas	LC	-	-
Mimidae	<i>Mimus gilvus</i> (Vieillot, 1807)	sabiá-da-praia		áreas úmidas (praia)	LC	-	-
	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		áreas úmidas (lagunar, lacustre, praia), área aberta	LC	-	-
Motacillidae	<i>Anthus chii</i> (Vieillot, 1818)	caminheiro-zumbidor		área aberta	LC	-	-
Parulidae	<i>Setophaga pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita		formações florestais, áreas antrópicas	LC	-	-
	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		formações florestais	LC	-	-
Passerellidae	<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo		formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
Passeridae	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal		áreas antrópicas	LC	-	-
Pipridae	<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira		formações florestais	LC	-	-
	<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	tangará			LC	-	-

Platyrinchidae	<i>Platyrinchus mystaceus</i> (Vieillot, 1818)	patinho		formações florestais	LC	-	-
Rhynchocyclidae	<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823)	abre-asa		formações florestais	LC	-	-
	<i>Leptopogon amaurocephalus</i> (Tschudi, 1846)	cabeçudo		formações florestais	LC	-	-
	<i>Tolmomyias flaviiventris</i> (Wied, 1831)	bico-chato-amarelo		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	teque-teque		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho		formações florestais	LC	-	-
	<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831)	tiririzinho-do-mato		formações florestais	NT	-	-
	<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	tachuri-campainha		formações florestais	LC	-	-
Thamnophilidae	<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)	choquinha-de-flanco-branco		formações florestais	LC	-	-
	<i>Formicivora serrana littoralis</i> (Gonzaga & Pacheco, 1990)	formigueiro-do-litoral		formações florestais, áreas úmidas	EN	-	-
	<i>Formicivora rufa</i> (Wied, 1831)	papa-formiga-vermelho		formações florestais	LC	-	-
	<i>Drymophila squamata</i> (Lichtenstein, 1823)	pintadinho		formações florestais	LC	-	-
	<i>Dysithamnus stictothorax</i> (Temminck, 1823)	choquinha-de-peito-pintado		formações florestais	LC	-	-
	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha		formações florestais	LC	-	-
	<i>Thamnophilus palliatus</i> (Lichtenstein, 1823)	choca-listrada		formações florestais, áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Thamnophilus ambiguus</i> (Swainson, 1825)	choca-de-sooretama		formações florestais, áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul		formações florestais	LC	-	-
Thraupidae	<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	saíra-de-chapéu-preto		áreas antrópicas, formações florestais	LC	-	-
	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho		formações florestais	LC	-	-
	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra		áreas antrópicas, formações campestres	LC	-	-
	<i>Sicalis luteola</i> (Sparman, 1789)	tipio		áreas antrópicas, formações campestres	LC	-	-
	<i>Hemithraupis flavicollis</i> (Vieillot, 1818)	saíra-galega		formações florestais	LC	-	-
	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		formações campestres	LC	-	-
	<i>Loriotus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo		formações florestais	LC	-	-
	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto		formações florestais	LC	-	-
	<i>Ramphocelus bresilia</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-beija-flor		formações florestais	LC	-	-

Thraupidae	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		formações florestais, formações campestres, área urbana	LC	-	-
	<i>Asemospiza fuliginosa</i> (Wied, 1830)	cigarra-preta		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Sporophila albogularis</i> (Spix, 1825)	golinho		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783)	coleiro-do-brejo		áreas antrópicas, formações campestres, áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Sporophila caerulea</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	x	áreas antrópicas, formações campestres, formações florestais	LC	-	-
	<i>Sporophila bouvreuil</i> (Statius Muller, 1776)	caboclinho	x	áreas antrópicas, formações campestres, formações florestais	LC	-	-
	<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	canário-do-campo		formações campestres	LC	-	-
	<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	x	formações florestais	LC	-	-
	<i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776)	tempera-viola		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Saltator similis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	trinca-ferro		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		áreas antrópicas, formações campestres, formações florestais	LC	-	-
	<i>Conirostrum bicolor</i> (Vieillot, 1809)	figuinha-do-mangue		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva		formações florestais	LC	-	-
	<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	cardeal-do-nordeste		formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
	<i>Stelpnia peruviana</i> (Desmarest, 1806)	saíra-sapucaia	x	formações florestais	VU	-	-
	<i>Stelpnia cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela		formações florestais	LC	-	-
	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaço-cinzento		áreas antrópicas, formações florestais	LC	-	-
	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1821)	sanhaço-do-coqueiro		áreas antrópicas, formações florestais	LC	-	-
	<i>Thraupis ornata</i> (Sparman, 1789)	sanhaço-de-encontro		formações florestais	LC	-	-
	<i>Tangara cyanocephala</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-militar		formações florestais	LC	-	-
	<i>Tangara seledon</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-sete-cores		formações florestais	LC	-	-
	<i>Tangara brasiliensis</i> (Linnaeus, 1766)	cambada-de-chaves		formações florestais	LC	-	-
Tityridae	<i>Pachyramphus polychropterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	x	formações florestais	LC	-	-

Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i> (Naumann, 1823)	cornuira		formações florestais, formações campestres, área urbana	LC	-	-
	<i>Cantorchilus longirostris</i> (Vieillot, 1819)	garrinchão-de-bico-grande		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Pheugopedius genibarbis</i> (Swainson, 1838)	garrinchão-pai-avô		formações florestais	LC	-	-
Turdidae	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		formações florestais, formações campestres, área urbana	LC	-	Apêndice II
	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		formações florestais, formações campestres, área urbana	LC	-	Apêndice II
	<i>Turdus amaurochalinus</i> (Cabanis, 1850)	sabiá-poca	x	formações florestais, formações campestres, área urbana	LC	-	Apêndice II
Tyrannidae	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		formações florestais, formações campestres, área urbana	LC	-	-
	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		formações florestais, formações campestres, área urbana	LC	-	-
	<i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823)	marianinha-amarela		formações florestais, áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Phaeomyias murina</i> (Spix, 1825)	bagageiro	x	formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
	<i>Pseudocolopteryx sclateri</i> (Oustalet, 1892)	tricolino		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	x	formações florestais, formações campestres, área urbana	LC	-	-
	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		formações campestres, área urbana	LC	-	-
	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado	x	formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho		formações florestais, formações campestres, área urbana	LC	-	-
	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei		formações florestais, formações campestres, área urbana	LC	-	-
	<i>Tyrannus melancholicus</i> (Vieillot, 1819)	suiriri	x	formações florestais, formações campestres, área urbana	LC	-	-
	<i>Tyrannus savana</i> (Daudin, 1802)	tesourinha	x	formações campestres	LC	-	-
	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	x	formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe	x	formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	príncipe	x	formações campestres	LC	-	-

Tyrannidae	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada		formações campestres, área urbana	LC	-	-
	<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	freirinha		formações campestres, áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Hirundinea ferrugínea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Euscarthmus meloryphus</i> (Wied, 1831)	barulhento		formações campestres	LC	-	-
	<i>Tyranniscus burmeisteri</i> (Cabanis & Heine, 1859)	piolhinho-chiador		formações florestais	LC	-	-
	<i>Elaenia parvirostris</i> (Pelzeln, 1868)	tuque-pium	x	formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	tucão		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho		formações florestais	LC	-	-
	<i>Knipolegus cyanirostris</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-de-bico-azulado		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Xolmis velatus</i> (Lichtenstein, 1823)	noivinha-branca		formações campestres, áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	x	formações florestais	LC	-	-
	<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823)	vissia		formações florestais	LC	-	-
	<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	peitica-de-chapéu-preto	x	formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno		formações campestres	LC	-	-
	<i>Lathrotriccus eulerei</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	x	formações florestais	LC	-	-
Vireonidae	<i>Hylophilus thoracicus</i> (Temminck, 1822)	vite-vite		formações florestais	LC	-	-
	<i>Vireo chivi</i> (Vieillot, 1817)	juruviera	x	formações florestais, áreas antrópicas	LC	-	Apêndice II
Xenopidae	<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	bico-virado-miúdo		formações florestais	LC	-	-
	<i>Xenops rutilans</i> (Temminck, 1821)	bico-virado-carijó		formações florestais	LC	-	-
PELECANIFORMES							
Ardeidae	<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi		formações florestais, áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789)	socoí-vermelho		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Ixobrychus involucris</i> (Vieillot, 1823)	socoí-amarelo		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	socó-dorminhoco		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho		áreas úmidas	LC	-	-

Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira		áreas úmidas, formações campestres	LC	-	-
	<i>Ardea cocoi</i> (Linnaeus, 1766)	garça-moura		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Ardea alba</i> (Linnaeus, 1758)	garça-branca-grande		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira		áreas úmidas, formações campestres	LC	-	-
	<i>Pilherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783)	garça-real		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena		áreas úmidas (lagunar, lacustre, praia)	LC	-	-
	<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	garça-azul		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Nyctanassa violacea</i> (Linnaeus, 1758)	savacu-de-coroa	x	áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Botaurus pinnatus</i> (Wagler, 1829)	socó-boi-baio		áreas úmidas	LC	-	-
Threskiornithidae	<i>Platalea ajaja</i> (Linnaeus, 1758)	colhereiro	x	áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Eudocimus ruber</i> (Linnaeus, 1758)	guará		áreas úmidas	LC	II	-
	<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca		áreas úmidas, formações campestres, áreas úmidas	LC	-	-
PICIFORMES							
Bucconidae	<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816)	joão-bobo		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
Picidae	<i>Picumnus cirratus</i> (Temminck, 1825)	picapauzinho-barrado		formações florestais, formações campestres	LC	-	-
	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	pica-pau-branco		formações campestres	LC	-	-
	<i>Veniliornis maculifrons</i> (Spix, 1824)	pica-pau-de-testa-pintada		formações florestais	LC	-	-
	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		formações florestais	LC	-	-
Ramphastidae	<i>Ramphastos toco</i> (Statius Muller, 1776)	tucanuçu		formações florestais, formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
	<i>Ramphastos vitellinus</i> (Lichtenstein, 1823)	tucano-de-bico-preto		formações florestais	LC	-	-
PHOENICOPTERIFORMES							
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopeterus chilensis</i> (Molina, 1782)	flamingo-chileno	x	áreas úmidas	NT	II	Apêndice II
PSITTACIFORMES							
Psittacidae	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde		formações florestais, formações campestres	LC	II	-
	<i>Amazona amazônica</i> (Linnaeus, 1766)	curica		formações florestais	LC	-	-
	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro		formações florestais, áreas antrópicas	LC	II	-

PODICIPEDIFORMES							
Podicipedidae	<i>Podiceps occipitalis</i> (Garnot, 1826)	mergulhão-de-orelha-amarela		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador		áreas úmidas	LC	-	-
	<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	mergulhão-pequeno		áreas úmidas	LC	-	-
STRIGIFORMES							
Strigidae	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato		formações florestais, áreas antrópicas	LC	II	-
	<i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)	caburé		formações florestais	LC	II	-
	<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> (Bertoni & Bertoni, 1901)	murucututu-de-barriga-amarela		formações florestais	LC	II	-
	<i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788)	jacurutu		formações florestais, formações campestres	LC	II	-
	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda		formações florestais	LC	II	-
	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira		áreas antrópicas, formações campestres, áreas úmidas (praia)	LC	II	-
Tytonidae	<i>Tyto furcata</i> (Temminck, 1827)	suindara		formações florestais, formações campestres, áreas antrópicas	LC	-	-
SULIFORMES							
Anhingidae	<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga		áreas úmidas	LC	-	-
Fregatidae	<i>Fregata magnificens</i> (Mathews, 1914)	fragata		áreas úmidas (praia)	LC	-	-
Phalacrocoracidae	<i>Nannopterum brasilianum</i> (Gmelin, 1789)	biguá		áreas úmidas	LC	-	-
Sulidae	<i>Sula leucogaster</i> (Boddaert, 1783)	atobá-pardo		áreas úmidas (praia)	LC	-	-
SPHENICIFORMES							
Sphenicidae	<i>Spheniscus magellanicus</i> (Forster, 1781)	pinguim-de-magalhães	x	áreas úmidas (praia)	LC	-	-
TINAMIFORMES							
Tinamidae	<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã		formações florestais	LC	-	-

Biodiversidade Brasileira – BioBrasil.
Fluxo Contínuo e Edição Temática:
Ciências Ambientais na Amazônia Sul Ocidental
n.3, 2025

<http://www.icmbio.gov.br/revistaelectronica/index.php/BioBR>

Biodiversidade Brasileira é uma publicação eletrônica científica do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que tem como objetivo fomentar a discussão e a disseminação de experiências em conservação e manejo, com foco em unidades de conservação e espécies ameaçadas.

ISSN: 2236-2886